



## Før intravenøs anestesi/sedasjon

### Intravenøs anestesi/sedasjon

- |   |  |
|---|--|
| > | <b>Intravenøs sedasjon.</b> Du får avslappende/sovemedisin direkte inn i blodåren, og dermed virker svært raskt. I tillegg får du lokalbedøvelse i operasjonsområdet. Etter operasjonen våkner du raskt, og de fleste kan spise og drikke med det samme, og reise hjem etter kort tid. |
| > | <b>Du skal møte fastende.</b> D.v.s. at du ikke skal spise, drikke eller røyke etter kl. 24 kvelden før inngrepet  |
| > | <b>Kjør ikke bil.</b> Du kan ikke kjøre bil etter inngrepet. Vi kan evt. være bestille transport til deg. Vi anbefaler at du har noen som følger deg, eller henter deg etter operasjon.  |
| > | <b>Vær ikke alene.</b> Du skal ikke være alene første kvelden og natten etter operasjonen.   |
| > | Ha på klær med ermer som kan brettes opp til over albuen, og sko med lave heler.   |
| > | Ikke bruk lepestift eller neglelakk operasjonsdagen  |
| > | Hvis du er forkjølet, har sår hales eller føler deg syk, gi beskjed til klinikken  |
| > | Bruker du faste medisiner må du forhøre deg med kirurgen om du skal ta disse. Bruker du Astma-spray kan du ta dette som vanlig.  |
| > | Alle pasienter som ønsker intravenøs sedasjon, må ha en konsultasjonstime først  |